

## **Mozgásleírás különböző vonatkoztatási rendszerekből**

Egy test mozgásának leírása általában úgy történik, hogy annak mindenkori helyzetét egy többé-kevésbé önkényesen választott testhez, egy ún. *vonatkoztatási rendszerhez* viszonyítva adjuk meg. A helyzet meghatározásához általában a vonatkoztatási rendszer egy pontjához rögzített *koordinátarendszert* veszünk fel, és a test mozgását jellemző adatokat ebben a koordinátarendszerben adjuk meg.

Könnyen belátható, hogy ha ugyanazt a testet két különböző, egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerből figyeljük meg, akkor a mozgását jellemző *adatok* egy részét (pl. helyzetvektor, sebesség, lendület, energia) eltérőnek találjuk. Felmerül a kérdés, hogy az adatok közötti összefüggéseket megadó *fizikai törvények* is különbözőek-e a különböző vonatkoztatási rendszerekben. Leegyszerűsítve: a kérdés az, hogy használhatja-e a robogó vonaton utazó megfigyelő ugyanazokat a fizikai törvényeket, amelyeket a Földhöz képest nyugvó laboratóriumban érvényesnek talált.

A kérdés vizsgálatát érdemes két részre bontani: először az egyszerűbb esetet nézzük meg, amikor egymáshoz képest (állandó sebességgel) mozgó *inerciarendszerekkel* foglalkozunk, majd ezután térünk át egymáshoz képest *gyorsuló rendszerek* tárgyalására.

### **Mozgásleírás egymáshoz képest mozgó inerciarendszerekből**

Vizsgáljunk két olyan rendszert, amelyek egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak, és mindkettőben érvényes a "tehetetlenség törvénye" (Newton I. axiómája), vagyis két inerciarendszerről van szó. Próbáljuk meg leírni ugyanannak a tömegpontnak a mozgását a két rendszerből nézve, és keressük meg a leírások közötti összefüggéseket.

Számos tapasztalat sugallja azt, hogy a különböző inerciarendszerekből nézve a mechanikai jelenségek ugyanúgy zajlanak le, és a különböző rendszerekben a mechanika törvényei azonos matematikai alakban érvényesek (természetesen csak akkor, ha adott rendszerben alkalmazva a törvényeket a bennük szereplő összes fizikai mennyiség helyébe ugyanabban a rendszerben mért adatokat helyettesítünk be). Ez a tapasztalatok alapján elfogadott alaptétel a *klasszikus mechanika relativitási elve*. A relativitás elvének fontos következménye, hogy az inerciarendszerek a mechanikai folyamatok leírása szempontjából egyenértékűek, vagyis mechanikai kísérletek segítségével nem lehet köztük különbséget tenni, így valamiféle "abszolút", kitüntetett inerciarendszert sem lehet találni.

Ha egy test mozgását két egymáshoz képest mozgó  $K$  és  $K'$  inerciarendszerből vizsgáljuk, akkor a test mozgását jellemző adatokra általában eltérő értékeket kapunk, de a két rendszerben mért adatok között összefüggések állnak fenn. Ezek az összefüggések a rendszerek egymáshoz viszonyított mozgása által meghatározott *koordináta-transzformációk* segítségével kaphatók meg, és ismeretükben egy fizikai törvényt áttranszformálhatunk egyik rendszerből a másikba az alábbi módon.

A  $K$  rendszerben felírt fizikai törvényben szereplő fizikai mennyiségeket a transzformációs összefüggések segítségével kifejezzük a  $K'$  rendszer megfelelő mennyiségeivel, és így megkapjuk a kérdéses fizikai mennyiségek közötti összefüggést (a fizikai törvényt) a  $K'$  rendszerben. Ha ez az összefüggés matematikai alakját tekintve azonos a  $K$  rendszerben felírt összefüggéssel, akkor azt mondhatjuk, hogy *a transzformáció összhangban van a relativitás elvével*.

Ha a relativitás elvét, mint tapasztalati tényt elfogadjuk, akkor csak vele összhangban álló transzformációt használhatunk. Elvileg elképzelhető, hogy olyan – fizikailag indokolható – transzformációt fogadunk el, amely nincs összhangban a relativitás elvével (a törvények

alakja a transzformációnál megváltozik), ekkor azonban nem tarthatjuk fenn a relativitás elvét.

Nézzük meg most, hogy a klasszikus mechanikában használt ún. *Galilei-féle transzformáció* összhangban van-e a mechanikában elfogadott relativitási elvvel.

### *A Galilei-transzformáció és a relativitás elve a klasszikus mechanikában*

A Galilei-transzformáció összefüggései a hétköznapi szemléleten alapulnak, és az alábbi egyszerű megfontolásokkal kaphatók. Az ábra  $P$  pontjában lévő tömegpont mindenkor helyzetét a  $K$  koordináta-rendszerből a mindenkor  $\mathbf{r}(t)$ -, a  $K'$  rendszerből pedig a mindenkor  $\mathbf{r}'(t)$  helyvektorral adhatjuk meg ( $t$  az idő). Ha a két rendszer relatív helyzetét megadó vektor  $\mathbf{r}_{K'}(t)$ , akkor a két rendszerben érvényes helyvektorok kapcsolata

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}'(t) + \mathbf{r}_{K'}(t).$$

Ha a  $K'$  rendszer a  $K$  hoz képest állandó  $\mathbf{w}$  sebességgel mozog (inerciarendszerekről van szó), akkor

$$\mathbf{r}_{K'}(t) = \mathbf{w}t + \mathbf{r}_0,$$

ahol  $\mathbf{r}_0$  a két rendszer origójának relatív helyzetét megadó vektor a  $t=0$  időpillanatban. Ezzel a fenti kifejezés így alakul

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}'(t) + \mathbf{w}t + \mathbf{r}_0,$$

ami a koordinátákkal kifejezve

$$x = x' + wt + x_0$$

$$y = y' + wt + y_0$$

$$z = z' + wt + z_0$$

$$t' = t.$$

Ez a klasszikus mechanika *Galilei-féle transzformációja*.

A fenti gondolatmenet fontos mozzanata, hogy az időt nem transzformáltuk, azaz természetesnek vettük, hogy a két rendszerben az idő azonos:

$$t' = t.$$

A sebességek közötti összefüggés a helyvektorok kapcsolatát megadó egyenlet idő szerinti differenciálásával kapható

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}'(t) + \mathbf{w},$$

ahol  $\mathbf{v}$  a vizsgált tömegpont  $K$  rendszerbeli sebessége,  $\mathbf{v}'$  annak  $K'$  rendszerbeli sebessége. Komponensekkel kifejezve:

$$v_x = v'_x + w_x$$

$$v_y = v'_y + w_y$$


$$v_z = v'_z + w_z.$$

Vagyis a hétköznapi tapasztalattal egyezésben azt kapjuk, hogy ugyanazon test sebességét egymáshoz képest mozgó megfigyelők különbözőnek találják.

A gyorsulások összefüggését a sebességre vonatkozó egyenlet idő szerinti differenciálásával kapjuk:

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{a}'(t).$$

A különböző inerciarendszerekből mért gyorsulások tehát azonosnak adódnak. Ez azt jelenti, hogy – a tapasztalattal összhangban – egy inerciarendszerhez képest egyenletesen mozgó rendszer szintén inerciarendszer.



Ezek után nézzük meg, hogy a Galilei-transzformáció összhangban van-e a relativitás elvével a mechanikai törvények esetében.

Először vizsgáljuk meg a tömegpontra vonatkozó közismert Newton-féle mozgástörvényt. A  $K$  rendszerben érvényes

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

törvényben szereplő mennyiségeket transzformáljuk át a  $K'$  rendszerbe.

A klasszikus fizikában feltételezett erőtvények esetén egy tömegpontra ható erő csak annak a többi testhez viszonyított helyzetétől, azokhoz viszonyított relatív sebességétől és az időtől függhet. Mivel ezek a mennyiségek a fenti transzformáció szerint a két rendszerben azonosnak adódnak, így az erők is azonosak maradnak az egyik rendszerből a másikba való átmenetnél:  $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$ . Másrészt láttuk, hogy  $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$ . Ha viszont a testek közötti kölcsönhatások és a gyorsulás a két rendszerben azonos, akkor az  $\mathbf{F}$  és  $\mathbf{a}$  közötti arányosság is érvényben marad, és a tömeg is azonos. Ez azt jelenti, hogy a mozgástörvénynek a  $K'$  rendszerbe áttanszformált alakja

$$\mathbf{F}' = m\mathbf{a}'$$

ami azonos a  $K$ -beli alakkal (ráadásul itt maguk a mennyiségek is azonosak maradnak).

Mint hogy a mechanika törvényei lényegében a kölcsönhatás törvényéből és a dinamika alapegyenletéből származtathatók, általánosan is kijelenthető, hogy a Galilei-transzformáció a mechanika törvényeit változatlanul hagyja egyik inerciarendszerből a másikba történő transzformáció során. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a Galilei-transzformáció a klasszikus mechanikában összhangban van a relativitás elvével.

Nem bizonyításként, csupán szemléltető példaként nézzük meg, hogyan teljesül ez az állítás a mechanika egy másik alapvető törvénye az lendület-megmaradási törvény esetén.

Vizsgáljunk két tömegpontot, amelyek mozgásuk során kölcsönhatásba lépnek, pl. ütköznek egymással. A testek tömege  $m$  és  $M$ , ütközés előtti sebességeik egy  $K$  rendszerben  $\mathbf{v}$  és  $\mathbf{V}$ , ütközés utáni sebességeik ugyanitt  $\mathbf{u}$  és  $\mathbf{U}$ . A  $K$  hoz képest  $\mathbf{w}$  sebességgel mozgó  $K'$  rendszerben jelöljük ugyanezeket a sebességeket  $\mathbf{v}'$ ,  $\mathbf{V}'$ ,  $\mathbf{u}'$ ,  $\mathbf{U}'$  -vel. Tegyük fel, hogy a lendület-megmaradás tétele alkalmazható a folyamatra és írjuk fel azt a  $K$  rendszerben:

$$m\mathbf{v} + M\mathbf{V} = m\mathbf{u} + M\mathbf{U}$$

Transzformáljuk át a sebességeket a Galilei-transzformáció segítségével a  $K'$  rendszerbe és írjuk be ebbe az egyenletbe. Ekkor az alábbi összefüggésre jutunk

$$m(\mathbf{v}' + \mathbf{w}) + M(\mathbf{V}' + \mathbf{w}) = m(\mathbf{u}' + \mathbf{w}) + M(\mathbf{U}' + \mathbf{w}),$$

amiből rendezés után kapjuk

$$m\mathbf{v}' + M\mathbf{V}' = m\mathbf{u}' + M\mathbf{U}'.$$

A transzformáció után tehát a lendület-megmaradás tételét a  $K'$  rendszerben valóban ugyanolyan alakban kaptuk meg, mint a  $K$  rendszerben.

Hasonló módon lehetne demonstrálni a Galilei-transzformációnak a relativitás elvével való összhangját más mechanikai törvények esetén is.

### ***A Galilei transzformáció és a relativitás elve az elektromágnességtanban, a speciális relativitáselmélet alap gondolata***


Az elektromágnességtan alapegyenletei, a Maxwell-egyenletek, a fizikának ugyanolyan alapvető törvényei, mint a Newton-törvények. E törvények kidolgozása idején a fizikai jelenségeket a mechanikai szemlélet alapján próbálták értelmezni, ezért semmi kétely nem merült fel abban a vonatkozásban, hogy a mennyiségeket és törvényeket a fizikának ezen a területén is a Galilei-transzformáció segítségével kell

egyik rendszerből a másikba transzformálni. Úgy gondolták, hogy létezik egy sajátos közeg, az ún. *éter*, amely mindent kitölt, és az elektromágneses jelenségek ennek a közegnek a mechanikai jellegű állapotváltozásaival függnek össze. Természetesnek tűnt, hogy a Maxwell-egyenletek az éterhez rögzített koordináta-rendszerben érvényesek, és hogy a fény, mint elektromágneses hullám nem más, mint egy ebben a közegben keltett zavar tovaterjedése, ami teljesen analóg a mechanikai hullámokkal. Ennek megfelelően a fény terjedési sebességét is az éterhez viszonyított sebességnek tekintették.

A mechanikai hullám-analógia alapján az is természetesnek látszott, hogy az éterhez képest  $\mathbf{w}$  sebességgel mozgó rendszerben a fény terjedési sebességét a megfigyelő a Galilei-transzformációnak megfelelő

$$\mathbf{c}' = \mathbf{c} - \mathbf{w}$$

értékűnek találja ( $\mathbf{c}$  a fény terjedési sebessége az éterhez viszonyítva). Ebből viszont az következik, hogy az éterhez képest mozgó rendszerben a fény terjedési sebessége függ a fény haladási irányától. A legnagyobb sebességet akkor mérhetjük, ha a fény haladási iránya ellentétes a  $\mathbf{w}$  sebesség irányával (ekkor a sebesség nagysága  $c' = c + w$ ), a legkisebb érték viszont akkor adódik, ha a fényterjedés iránya megegyezik a  $\mathbf{w}$  sebességvektor irányával (ekkor a sebesség nagysága  $c'' = c - w$ ). Ha  $\mathbf{w}$  irányát fénysebesség-mérésekkel kísérletileg megkeressük, akkor elvileg meghatározhatjuk a vonatkoztatási rendszerünknek az éterhez viszonyított sebességét is (ábra).



A fenti gondolatmenet alapján a múlt század végén Michelson és Morley végzett el egy kísérletsorozatot abból a célból, hogy meghatározzák a Földnek az éterhez viszonyított sebességét (a  $\mathbf{w}$  sebességgel mozgó rendszer ekkor maga a Föld). A kísérlet kivitelezése (aminek részleteivel itt nem foglalkozunk) praktikus okokból más volt, mint a fenti gondolat-kísérleté, de elvét tekintve a két eljárás azonos.

A kísérlet végeredménye úgy foglalható össze, hogy a különböző irányban haladó fénysugaraknál a fényterjedési sebességek között nem sikerült különbséget kimutatni (így természetesen a  $\mathbf{w}$  sebesség meghatározása sem sikerült). Ezt az eredményt még lehetett volna úgy értelmezni, hogy a kísérlet idején a Föld az éterhez képest éppen nyugalomban volt, de a kísérletet az év különböző időpontjaiban (azaz a Föld különböző haladási irányai esetén) megismételve ugyanezt az eredményt kapták.


Ez az eredmény azt a – klasszikus fizika alapján elképzelhetetlen – következtetést sugallta, hogy a fény bármely inerciarendszerben minden irányban ugyanolyan  $c$  sebességgel terjed. Ha ez így van, akkor viszont a fény terjedésére nem alkalmazható a Galilei-transzformáció, ami komoly problémákat sejtet az elektromágneség-tan törvényeit illetően. A fény ugyanis elektromágneses hullám, amelynek terjedését a Maxwell-egyenletek írják le. Ha terjedésére nem alkalmazható a Galilei-transzformáció, akkor várható, hogy ez a transzformáció az elektromágneség-tan törvényeit sem viszi át változatlan alakban egyik inerciarendszerből a másikba. A

helyzet valóban ez, vagyis az elektromágnességtanban a Galilei-transzformáció nincs összhangban a relativitás elvével.

### A Lorentz-transzformáció

A Maxwell-egyenletek matematikai elemzésével természetesen megtalálható az a transzformáció, amely változatlan alakban viszi át azokat egyik rendszerből a másikba a  $c = c'$  tény figyelembevételével. Ezt a transzformációt Lorentz találta meg, és ma Lorentz-transzformáció néven ismerjük.

A Lorentz által megtalált transzformációs képleteket itt az egyszerűség kedvéért a két koordináta-rendszer speciális választása esetén adjuk meg (ábra). A speciális választás azt jelenti, hogy a két rendszer  $x$  tengelye közös, és a  $K'$  rendszer a  $K$  hoz képest  $w$  sebességgel mozog az  $x$  tengely mentén annak pozitív irányában, továbbá az időt mindkét rendszerben attól a pillanattól mérik, amikor a két origó ( $O$  és  $O'$ ) azonos helyen volt (ekkor  $t=t'=0$ ).



Először emlékeztetőül írjuk fel erre az esetre a Galilei-transzformációt:

$$x' = x - w t \quad y' = y \quad z' = z \quad t' = t$$

Az elektromágnességtan egyenleteit változatlanul hagyó – matematikai úton megtalált – Lorentz-transzformáció képletei ezzel szemben

$$x' = \frac{x - w t}{\sqrt{1 - \frac{w^2}{c^2}}} \quad y' = y \quad z' = z \quad t' = \frac{t - \frac{w}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{w^2}{c^2}}}$$

A relativitás elvének teljesítése tehát megköveteli, hogy az időt is transzformáljuk, másrészt a térkoordináták közötti összefüggés a Galilei-transzformáció megfelelő összefüggésétől egy a  $w$  relatív sebességtől függő

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{w^2}{c^2}}}$$

faktorban különbözik.

Könnyen belátható (pl. a lendület-megmaradási törvényre való alkalmazás kapcsán), hogy a Lorentz-transzformáció a mechanika törvényeit nem viszi át változatlanul egyik inerciarendszerből a másikba: vagyis ez a transzformáció a mechanikában nincs összhangban a relativitás elvével.

Az előzőekben vázolt helyzetet az alábbi táblázattal szemléltethetjük, ahol a fizika két nagy területén a két transzformációnak a relativitás elvéhez való viszonyát tüntettük fel (a "+" jel azt jelenti, hogy a transzformáció alkalmazása során a relativitás elve teljesül-, a "-" jel pedig azt, hogy nem teljesül).

	<b>GALILEI- transzformáció</b>	<b>LORENTZ- transzformáció</b>
<b>MECHANIKA</b>	+	-
<b>ELEKTROMÁGNESÉGTAN</b>	-	+

Ezek után elvileg az alábbi lehetőségek között választhatunk:

a) Beletörődünk abba, hogy a különböző jellegű fizikai folyamatokban (mechanikai, elektromágneses) ugyanazok a fizikai mennyiségek különbözőképpen transzformálódnak két rendszer között, ami lényegében azt jelenti, hogy általános formájában feladjuk a relativitás elvét.

b) Fenntartjuk a relativitás elvét, és elfogadjuk a józan észnek" megfelelő Galilei-transzformációt, de ekkor hibásnak kell minősítenünk a Maxwell-egyenleteket. Az elektromágnességtan törvényeit tehát úgy kell átalakítanunk, hogy azokat a Galilei-transzformáció változatlanul hagyja.

c) Fenntartjuk a relativitás elvét, és elfogadjuk a Lorentz-transzformációt, de ekkor a mechanika törvényeit kell elvetnünk, és úgy átalakítanunk, hogy a Lorentz-transzformáció változatlanul hagyja azokat.

Miután nincs olyan tapasztalat, amely arra utalna, hogy a relativitás elve ne lenne érvényes, az a) lehetőséget elvethetjük. A b) lehetőséget azért nem választhatjuk, mert ismerünk olyan jelenséget (fény terjedése), amelyre a Galilei-transzformáció nem érvényes. Így marad a c) lehetőség.

A század első éveiben ehhez a következtetéshez többen is eljutottak (Lorentz, Poincaré, Einstein), de Einstein volt az aki általános fizikai elmélet formájába öntötte a c) pontban megfogalmazott követelményeket. Ő vette észre, hogy a tapasztalati tényekkel egyező elmélet két alapvető fizikai elvből levezethető:

- ◆ A fizikai folyamatokat leíró törvények minden inerciarendszerben azonos matematikai alakban érvényesek. Más szóval, minden fizikai folyamatra érvényes a *relativitás elve*.
- ◆ A vákuumban terjedő fény sebessége minden inerciarendszerben azonos, *univerzális fizikai állandó*.

Ebből a két alapelvből levezethető a Lorentz-transzformáció, és segítségükkel elvégezhető a mechanika törvényeinek szükséges átalakítása. Az így létrejött, a fenti két elvvel összhangban álló fizikai elmélet a *speciális relativitáselmélet*. Nevében a "speciális" jelző arra utal, hogy csak speciálisan választott koordinátarendszerekben, nevezetesen *inerciarendszerekben* érvényes.

A Lorentz-transzformáció fontos tulajdonsága, hogy a fénysebességhez képest kis  $w$  relatív sebességeknél a Galilei-transzformációba megy át, vagyis nem túl nagy sebességeknél továbbra is érvényesek a klasszikus mechanika törvényei.

A fenti két alapelv elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az "étert" nem tekinthetjük fényhordozó közegnek, hiszen a fénysebesség a mozgásállapottól független, és nem tekinthetjük valamiféle kitüntetett vonatkoztatási rendszernek sem, mivel a relativitás elve érvényes. Ezzel viszont elveszítette értelmét az éter létének feltételezése is.

### **Mozgásleírás egymáshoz képest gyorsuló rendszerekből, a tehetetlenségi erők**

Egymáshoz képest nem túl nagy sebességgel mozgó inerciarendszerekben a Newton törvények változatlan alakban használhatók.

Mi a helyzet egy inerciarendszerhez képest gyorsuló rendszerben?

#### ***Transzformációs összefüggések egymáshoz képest gyorsuló, translációs mozgást végző rendszerekben***

A legegyszerűbb eset az állandó gyorsulású translációs (haladó) mozgás.

Vegyük fel a  $K$  inerciarendszerben (pl. a terem) a koordinátatengelyeket úgy, hogy a hozzá képest translációs mozgást végző  $K'$  rendszer (pl. egy kocsi) a  $K$  rendszer  $x$ -tengelye mentén mozogjon, a  $K'$  rendszerbeli  $x'$ -tengely pedig essen az  $x$ -tengelyre

(ábra). A  $K'$  rendszer a közös  $x, x'$ -tengely mentén  $a_0$  állandó gyorsulással mozog a  $K$ -hoz képest. Az általános Galilei-transzformáció szerint (most a  $w$  relatív sebesség nem állandó!!!):

$$x(t) = x'(t) + x_{K'}(t)$$

$$v_x(t) = w(t) + v_{x'}(t)$$

$$a_x(t) = a_0 + a_{x'}(t).$$

Eszertint egy tömegpont gyorsulása a  $K'$  rendszerben

$$a_{x'}' = a_x - a_0,$$

vagyis a  $K'$  nem inerciarendszer, hiszen a  $K$ -ban nem gyorsuló tömegpont ( $a_x = 0$ ) a  $K'$ -ben gyorsul ( $a_{x'}' = -a_0 \neq 0$ ).

A fenti egyenletből  $m$ -mel való szorzással kapjuk, hogy

$$ma_{x'}' = ma_x - ma_0 = F_x - ma_0,$$

ahol  $F_x = ma_x$  a  $K$  rendszerben a tömegpontra ható erő. Látszik, hogy  $K'$ -ben Newton II. törvénye nem érvényes ( $F_x = 0$  esetén  $a_{x'}' = -a_0 \neq 0$ ).

Használhatóvá válik a törvény, ha feltételezzük, hogy a  $K'$ -ben a tömegpontra

$$F_{x'}' = F_x - ma_0$$

erő hat, vagyis a  $K$ -ban működő erőt ki kell egészíteni egy

$$F_{ix} = -ma_0$$

ún. *tehetetlenségi erővel*. Ezzel az

$$F_{x'}' = ma_{x'}'$$

egyenletet kapjuk, amiből az  $F_x = 0$  esetben a tényleges  $a_{x'}' = -a_0$  gyorsulást kapjuk.

Ha a koordinátarendszerek nem a tárgyalt speciális relatív mozgást végzik, akkor a fenti gondolatmenet mindegyik koordinátára alkalmazható, és  $\mathbf{a}_0$  relatív gyorsulás és  $\mathbf{F}$  erő esetén, a kapott eredmények vektori formában érvényesek:

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \mathbf{a}_0$$

$$\mathbf{F}' = \mathbf{F} - m\mathbf{a}_0$$

$$\mathbf{F}_t = -m\mathbf{a}_0.$$



### ***Tehetlenségi erők forgó rendszerben***

Egy inerciarendszerhez képest egyenletesen forgó rendszerben szintén megjelennek tehetetlenségi erők: a forgó testhez rögzített koordinátarendszerben a rendszerhez képest nyugvó tömegpont körpályán mozog, tehát az inerciarendszerből nézve gyorsul.

A translációnál látottak alapján kézenfekvőnek látszik, hogy a tehetetlenségi erő ekkor a centripetális gyorsulással arányos és vele ellentétes irányú (ábra)

$$\mathbf{F}_t = -m\mathbf{a}_0 = -m\mathbf{a}_N = -m\mathbf{a}_{cp} = -m\omega^2 \mathbf{u}_N.$$

A kísérletek azt mutatják, hogy a forgó rendszerben ilyen erő valóban létezik, és *centrifugális erőnek* nevezik.




**KÍSÉRLETEK:**

- ◆ Rugóra függesztett, vízszintes síkban körbeforgatott golyó a tengelyt jól mérhető erővel húzza (rugós erőmérő).
- ◆ Rugalmas lemezekből készített gömbalakú test forgatáskor a tengelyre merőlegesen kidomborodik (a tengely mentén összelapul), ún. geoid alakot vesz fel (ilyen a forgó Föld alakja is).
- ◆ Vízszintes rúdra mozgathatóan felszerelt, cérnával összekötött golyókat a rúdra merőleges tengely körül  $\omega$  szögsebességgel megforgatva, a golyók akkor maradnak egyensúlyban, ha a tengelytől mért távolságaik ( $r_1, r_2$ ) és a tömegeik ( $m_1, m_2$ ) között fennáll az  $m_1 r_1 \omega^2 = m_2 r_2 \omega^2$  összefüggés.
- ◆ Vízszintes tengely körül megforgatott kerékpárlánc merev kerékként gurul, vagy megforgatott kör alakú papírlap olyan merev lesz, hogy vágni lehet vele.

A centrifugális erőnek számos egyéb megnyilvánulását ismerjük.

- ◆ A Földről nézve a centrifugális erő az oka annak, hogy a Föld nem gömb alakú, hanem a sarkokon kissé belapult ún. geoid.
- ◆ A Földön mért "nehézségi" gyorsulás a gravitációs- és a centrifugális erő együttes fellépésének eredménye. Mivel azonos szögsebességnél a kerületi sebesség a sugár függvénye, a centrifugális erő a forgástengelytől mért távolságtól vagyis az ábrán a  $\psi$  szögtől függ:



$F_{cf} = m r \omega^2 = m R \omega^2 \cos \psi$  ( $R$  a Föld sugara). Emiatt

változik a Földön mért "nehézségi" gyorsulás, ha észak-déli irányban haladunk:


$$g' = \frac{G'}{m} = g \frac{\sin \psi}{\sin(180 - \delta - \psi)}, \text{ ahol } g = \frac{G}{m}.$$

- ◆ A centrifugális erő fellépésével magyarázható a centrifuga működése is (ha benne ülünk). A centrifugába tett részecskékre fellép a centrifugális erő, amely nagy fordulatszámnál a nehézségi erőnél sokkal nagyobb. Mivel ez – a nehézségi erőhöz hasonlóan – a tömeggel arányos erő, hatása a forgástengelyre merőleges irányban ugyanaz, mint a nehézségi erőé függőlegesen. Ezért a nagyobb sűrűségű anyagok a tengelytől távolabb, a kisebb sűrűségűek a tengelyhez közelebb gyűlnek össze.

A tapasztalat szerint forgó rendszerben nem csak a centrifugális erő lép fel.

**KÍSÉRLETEK:**

- ◆ Függőleges tengely körül forgatható, vízszintes kormozott lapra a tengelytől néhány centiméterre egy golyót rögzítünk, amit egy szerkezettel forgás közben szabaddá teszünk. A golyó a lapon nem sugárirányban kifelé mozog, hanem az ábra szerinti görbe mentén, amit a koromrétegbe be is rajzol. Itt oldalirányú erőnek is fel kell lépni Ez az ún. *Coriolis-erő*.
- ◆ A forgó Földhöz rögzített hosszú inga lengési síkja lassan elfordul, ami ugyanennek a hatásnak tulajdonítható.





Az említett kísérletek mellett a Coriolis-erőnek számos egyéb megnyilvánulása van.

- ◆ A Coriolis-erő az oka, hogy a Földön kilőtt lövedék eredeti irányától eltér (pl. Dél–Észak irányú mozgásnál az északi féltekén jobbra, a délin balra; *l.* az ábrát).
- ◆ Hasonlóan értelmezhető, hogy a Föld felé szabadon eső test az eredeti mozgásirányától keletre tér el. Az eltérés nem nagy: *100 m*-ről eső test esetén kb. *1,5 cm*.
- ◆ Ugyancsak a Coriolis-erő okozza, hogy a Földön Kelet–Nyugat irányban mozgó testekre lefelé ható erő lép fel (súlyuk megnő), Nyugat–Kelet irányban mozgó testekre felfelé ható erő lép fel (súlyuk lecsökken). Ez az Eötvös-effektus. A látszólagos tömegváltozás nagyságrendje: *1 m/s* sebességű, *70 kg*-os testnél kb. *1 g*.
- ◆ A Coriolis-erőnek szerepe van a légköri jelenségek alakulásában is. Egy alacsonyabb nyomású helyre minden oldalról beáramló légtömegek eredetileg sugárirányban a hely felé mozognak, de a Coriolis-erő eltéríti őket, így örvénylő mozgás jön létre (ábra).

